


# 今年の夏は「守る」×「内側からケアする」

輝く毎日を送りたい方、年齢とともに気になる美容の維持に

## そこで注目したいのが胡麻若葉の 「植物力＝アクテオシド力」

夏の肌は「見えない攻撃」にさらされている  
夏は一年で最も紫外線が強い季節です。



そのダメージの原因は  
「悪い環境因子」

紫外線も悪い「環境因子」のひとつに



コンディションが  
乱れやすくなる

健康・  
美容上の  
ゆらぎに

## なぜ「胡麻若葉」なのでしょう？

理由 ポリフェノールの一種「アクテオシド」を含有。

| 果実、野菜、海草類、米類  | μmol・Trolox 当量 /g |
|---------------|-------------------|
| イチジク          | 22.0              |
| カキ(前川次郎)果皮    | 12.6              |
| カキ(蓮台寺)果肉     | 26.5              |
| ウメ(白加賀)       | 30.6              |
| 巨峰(果皮)        | 68.4              |
| ウンシュウミカン      | 19.3              |
| ホウレンソウ(朝霧)    | 14.9              |
| モロヘイヤ(葉・葉柄・茎) | 84.7              |
| オクラ           | 68.4              |
| タカナ(赤大葉)      | 22.9              |
| トマト(ハウス桃太郎)   | 13.3              |
| シソ(葉・葉柄)      | 343.4             |
| 紫黒米(玄米)       | 6.5               |
| ひじき           | 188.4             |
| 胡麻若葉粉末        | 70.7              |


(乾物gあたり)

野菜と比較すると…

トマト・  
ホウレンソウの  
約4から5倍の  
植物力に  
着目!!

参考資料:  
野菜、果物の数値は  
三重県科学技術振興センター  
工業研究部研究報告 No.31 (2007)  
三重県科学技術振興センター工業研究部  
研究報告No.32 (2008) より

ORACで比較すると…



※胡麻若葉末島根県産ロット110125使用  
試験機関:財)日本食品分析センターNo.11101576001-01  
胡麻若葉、抹茶しよこ粒以外の数値は「澱粉と食品37号」より引用



胡麻を通じて健康を科学する  
～香りと機能、個性ある胡麻をお届けします～

株式会社

わだまんサイエンス

〒604-0845 京都市中京区二条殿町546 NT都ビル9F

TEL 075-222-7318 FAX 075-222-0318

インターネット [わだまんサイエンス] 検索

